

PROLAPSO PELVIANO IRREDUCTIBLE A CAUSA DE MASA OVÁRICA EXTRAPÉLVICA, A PROPÓSITO DE UN CASO

AUTORES: GABRIELLI N.A; PROSPITTI M.J; LOPRESTI E.F; MORON D.H

INSTITUCIÓN: UNIDAD DE PISO PÉLVICO, SERVICIO DE GINECOLOGÍA, HOSPITAL CENTRAL, MENDOZA

OBJETIVO: PRESENTAR UN CASO DE PROLAPSO PELVIANO IRREDUCTIBLE A CAUSA DE MASA OVÁRICA EXTRAPÉLVICA CON NECESIDAD DE RESOLUCIÓN URGENTE POR UROPATÍA OBSTRUCTIVA E INSUFICIENCIA RENAL AGUDA

MÉTODO: ANÁLISIS CUALITATIVO DE UN CASO REAL DE PROLAPSO PELVIANO IRREDUCTIBLE A CAUSA DE MASA OVÁRICA EXTRAPÉLVICA

RESULTADOS: PACIENTE DE 49 AÑOS, POSTMENOPÁUSICA, DIABÉTICA, MULTÍPARA, CONSTIPADA CRÓNICA, SIN ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS NI Hábitos tóxicos, QUE REVELÓ HISTORIAL DE SENSACIÓN DE BULTO EN VAGINA DE 2 AÑOS DE EVOLUCIÓN, INICIALMENTE REDUCTIBLE, LUEGO IRREDUCTIBLE, ASOCIADO A DOLOR PELVIANO E INCONTINENCIA URINARIA Y DE GASES. ACUDE TRAS 1 MES DE INTERNACIÓN EN CENTRO PERIFÉRICO, A CENTRO DE MAYOR COMPLEJIDAD POR COMPROMISO DE FUNCION RENAL Y TRAS VARIOS INTENTOS FALLIDOS DE REDUCCIÓN.

AL EXAMEN FISICO SE EVIDENCIÓ PROLAPSO PELVIANO COMPLETO DURO-PÉTREO, CON ÁREAS ULCERADAS, ZONAS EDEMATIZADAS, ESCARAS POR DECÚBITO Y HEMORROIDES G3. SE SOLICITARON ESTUDIOS POR IMÁGENES Y EVALUACIÓN BAJO ANESTESIA, SIN LOGRAR REDUCCIÓN. LA ECOGRAFÍA ABDOMINAL INFORMÓ ÚTERO Y OVARIOS NO VISUALIZADOS COMO TALES, MARCADA HIDRONEFROSIS BILATERAL. LA ECOGRAFÍA REALIZADA AL PROLAPSO GENITAL, INFORMÓ FORMACIÓN EXPANSIVA SÓLIDA, HIPOECOICA, HOMOGÉNEA, DE MÁRGENES DEFINIDOS Y BORDES REGULARES DE 16X11X11 CM VOL. 1041ML, CON ESCASA VASCULARIZACIÓN. SUGESTIVO DE MIOMA. LA RMN INFORMÓ DESCENSO DEL SUELO PÉLVICO CON COMPROMISO DE LOS 3 COMPARTIMIENTOS Y VOLUMINOSO PROLAPSO DE LOS 2/3 INFERIORES DE VEJIGA, ÚTERO, OVARIO IZQUIERDO, PERITONEO Y RECTO. OVARIO DERECHO CON IMAGEN QUÍSTICA COMPLEJA, PROLAPSADA, UBICADA ENTRE ÚTERO Y RECTO.

SE PLANTEÓ LA RESOLUCIÓN DEL CASO EN DOS TIEMPOS QUIRÚRGICOS, EL PRIMERO DE RESOLUCIÓN AGUDA CON VÍA DE ABORDAJE COMBINADA, ABDOMINAL Y VAGINAL Y UN SEGUNDO TIEMPO UNA VEZ RESUELTO EL PROCESO INFLAMATORIO ANTERIOR.

CONCLUSIONES: EL PROLAPSO GENITAL COMPLETO IRREDUCTIBLE A CAUSA DE UNA MASA OVÁRICA EXTRAPÉLVICA ES UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE Y DE DIFÍCIL RESOLUCIÓN QUE PLANTEA UN DESAFÍO EN LA PLANIFICACIÓN DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA. EL MANEJO

OPORTUNO DE LOS PROLAPSOS DE ORGANOS PELVICOS PUEDE REDUCIR LA MORBILIDAD Y MEJORAR LOS RESULTADOS EVITANDO COMPLICACIONES.

